

Aves del Club Lagos de Caujaral

Arcelio U. Blanco Nuñez



La presente colección se basa en dos observaciones en los terrenos del Club y una desde el exterior del Club en la orilla del Lago.
Es el mismo habitat lacustre y de bosque seco y la observación de las aves del lago se aprecian en ambas orillas.
De las aves descritas algunas son migratorias y se registran solo en algunas épocas del año.


Notas del Autor.

Este libro forma parte de una serie de publicaciones de aves fotografiadas en Barranquilla y sus alrededores y con la expectativa de un proyecto mayor de un catálogo de aves del Departamento del Atlántico.
Barranquilla situada en la orilla occidental del Delta del Río Magdalena presenta un variado paisaje natural como son sus fuentes hidrográficas, pequeños lagos, caños, playas marinas y el mismo río en las cercanías de su desembocadura. Además, bosques secos y áreas construidas por el hombre como son sus parques y bulevares y que se han convertido en refugios para aves autóctonas y migratorias.
Según la aplicación eBird, de la Universidad de Cornell, que estimula la *Observación, registro, análisis* y *creación* de mapas migratorios de las aves; en Barranquilla y sus alrededores existen 14 sitios de interés para la observación de las aves que enumeraré a continuación

Sitios de interés para observaciones de aves en Barranquilla y sus alrededores.

Aeropuerto Ernesto Cortizos.	27 especies.
Ecoparque metropolitano.	28 especies.
Jardín Botánico Barrio La Victoria	36 especies.
Intendencia Fluvial de Barranquilla	24 especies.
Parque Santander y Fundadores	27 especies.
Escuela Normal Superior la Hacienda	40 especies.
Parque Sagrado Corazón.	27 especies.
Malecón Puerta de Oro	29 especies.
Corredor Villa Santos	19 especies.
Universidad del Norte	174 especies.
Ciénaga de Mallorquín	104 especies.
Club Lagos de Caujaral	112 especies.
Ciénaga de Mallorquín- Barra Arena	86 especies
Canchas de Golf Country Club	56 especies.

La presente serie recopila una colección de aves fotografiadas en el Club Lagos de Caujaral, situado en el Kilómetro 9 de la antigua vía a Puerto Colombia, lugar privilegiado para la observación de aves.
Su ecosistema de bosque seco tropical y el ambiente lacustre propiciado por dos pequeños lagos separados por campos de golf, dan albergue a una gran variedad de aves de las que se han contabilizado112 especies, entre aves nativas y migratorias.
No todas las aves reportadas dentro del catálogo de observación de aves del Club, han sido fotografiadas en sus predios, pero si se les ha podido fotografiar en otros lugares de la ciudad y por eso se han omitido sus imágenes pare evitar la redundancia fotográfica.




Borde Occidental del Lago del Cisne sitio de refugio de a



Alcaraván: ***Burhinus bistriatus.***
Double-stripe Thick-Knee

Ave de ojos grandes y patas largas amarillas de facie asustada. Su cabeza presenta una estría superciliar blanca repintada por encima por un borde negro o café oscuro. Sus grandes ojos amarillos con pupila negra, pico corto y fuerte. La parte superior y pecho color café, el vientre es blanco.
En nuestro hábitat se le encuentra en los campos de golf y entre pastizales entre arbustos o a campo abierto, Descrito como de hábitos crepuscular y nocturno, los especímenes observados se han fotografiado a pleno sol, en parejas o solitarios. Se les observa durante todo el año.
Su estado de conservación es de preocupación menor.

Fotos tomadas 4 de Mayo 2019.
https://ebird.org/species/dstkne




Carpintero corona roja: *Melanerpes rubricapillus*, Red-crowned Woodpecker.

Esta ave vive en los tronco de árboles muertos en agujeros construidos por él. Como característica importante está la posición vertical que adopta al posarse en los árboles, utilizando las plumas de su cola como punto de apoyo. Estas tienen un estrato corneo que les da mayor dureza.
El macho además del color rojo de la cabeza tiene un parche color rojo en la nuca. Las hembras, carecen de este parche.
El estado de conservación es de preocupación menor.

Foto tomada el 4 de Mayo de 2019.
https://ebird.org/species/recwoo1












Pellar, Teru Teru: *Vanellus chilensis,* Southern Lapwing.

Es un ave nativa de América del Sur y se le encuentra desde Colombia hasta Argentina y es el símbolo de la selección de Rugby de Uruguay.
Su presencia es común en cañadas y lagunas. Su aspecto conspicuo lo hace inconfundible por su plumaje blanco en la parte ventral con una pechera negra que se extiende al cuello y al entrecejo. Sus llamativos ojos rojos y los colores de tintes marrón tornasolados lo hacen muy fácil de identificar.
Son aves territoriales que como arma, tienen unos espolones en la punta de las alas con los que amedrentan a sus contrincantes.
Su estado de conservación es de preocupación menor.

Foto tomada 4 de Mayo de 2019
https://ebird.org/species/soulap1



Cucarachero chupahuevos:
Campylorinchus griseus,
Bicolored Wren.

Ave presente en todo el ambiente urbano y de los alrededores de la ciudad, de llamado potente y de andar en parejas, construyendo nidos desordenados en su apariencia, también se apoderan de nidos abandonados por otras aves. Son ruidosos y pueden cantar en duetos. No hay dimorfismo sexual.

Estado de conservación: preocupación menor.

Foto tomada 4 de Mayo 2019.


Cucarachero blanquinegro:
Campylorinchus nuchalis,
Stripe-backed Wren.

Ave de comportamiento peculiar por ser capaz de criar en forma cooperativa a los polluelos. Viven en grupos de 2 a 10 aves adultas, emparentadas entre sí y son capaces de cuidar el nido y el territorio donde anidan. Los miembros no reproductores del grupo suelen ser dependientes o hermanos de los actuales progenitores. No tienen dimorfismo sexual.
Habitan las sabanas del norte de Colombia y Venezuela.

El estado de conservación es de preocupación menor.

Foto tomada el 4 de Mayo de 2019.
https://ebird.org/species/stbwre2?siteLanguage=es





Hormiguerito pechinegro: *Formicivora grisea,* White-fringed Antwren.

Ave inquieta dificil de fotografiar entre el matorral donde se esconde. Sus colores lo hacen inconfundible entre el matorral árido. Habita en bosques en crecimiento secundario, sabanas inundadas, matorrales áridos y montes secos.
Se alimenta de pequeños insectos y otros artrópodos.
Se le puede encontrar en parejas cerca al piso, pero también se une a grupos mixtos de aves insectívoras.

Estado de conservación: Preocupación menor.


Fotografía tomada el 4 de Mayo de 2019.
https://ebird.org/species/whfant1?siteLanguage=es

Carpintero Castaño: *Picumnus Cinnamomeus,* Chestnut piculet.

Es un ave endémica de Colombia y Venezuela se encuentra e la región Caribe y los valles de los ríos Cauca y Magdalena.
Habita en bosques secos, manglares, bosques deciduos, bosques húmedos, matorrales áridos y semiáridos, plantaciones de café y áreas abiertas con arboles dispersos.
Como se puede apreciar parece tener un comportamiento adaptativo, se mueve activamente entre troncos y ramas sin utilizar la cola como soporte.

Estado de conservación: preocupación menor.

Fotografía: Mayo 4 de 2019.
https://ebird.org/species/chepic1




Loro común o Loro real: *Amazona Ochrocephala,* Yellow-crowned Amazon.


Ave muy común como mascota en nuestro medio. Su realición con el humano es tal que logra aprender su lenguaje y aparenta inteligencia por la coherencia de su comportamiento. Es una especie nativa de casi toda America y su presencia se registra desde México hasta Bolivia, incluyendo a la Florida y Puerto Rico.

Su alimentación natural se basa principalmente en frutos,nueces, semillas y cacahuetes. En cautiverio puede tolerar una alimentación diversa, llega a ser muy amistoso con su humano cuidador con quien llega a vivir fuera de jaulas y con quien se comunica verbalmente.

Estado de conservación: Preocupación menor.

https://ebird.org/species/ywcpar





Perico cara sucia: *Eupsittula pertinax,* Brown throated Parakeet.

Ave escandalosa e inteligente fácil de domesticar muy sociables andan en bandadas delatando su presencia. Es nativa del norte de Suramérica e introducida en Puerto Rico y otras de las islas de las Antillas Menores. Son monógamas teniendo la misma pareja de por vida. Alcanzan la madurez a los tres años.

Ponen de dos a seis huevos y los pichones eclosionan después de 22 a 25 días, permaneciendo los pichones con sus padres hasta que pueden defenderse solos. Especie amenazada por el comercio ilegal, tala de bosques y pesticidas. Estado de conservación preocupación menor.

Foto tomada 29 de Mayo 2019.
https://ebird.org/species/brtpar1?siteLanguage=es




María mulata: *Quiscalus mexicanus*, Great-tailed Grackle.

Ave con dimorfismo sexual, siendo el macho de color negro intenso y ojos amarillos. La hembra más pequeña es marrón.
Es gregaria, pernocta y anida en colonias, forrajea principalmente en el suelo,siendo su alimentación muy variada, prácticamente es omnímoda. Tiene un comportamiento agresivo y es audaz en la consecución de sus alimentos. Se ha convertido en un azote de restaurantes y hoteles cerca de las playas y cuerpos de agua.

Estado de conservación: preocupación menor.

Fotografia: 16 de Febrero de 2020.



Trepador pico de lanza: *Dendroplex picus,* Straigth billed Woodcreeper.

Se le encuentra en hábitats variados como tierras bajas, manglares, matorrales áridos,en potreros y charcas. También se le ve cerca de cuerpos de agua, como es nuestro caso. Al igual que los carpinteros, utiliza la cola como soporte.
Se alimenta de insectos y pequeños vertebrados y frutos.

Estado de conservación: Preocupación menor.

Foto tomada el 16 de febrero 2020
https://ebird.org/species/stbwoo2

Barranquero ferina: *Momotus subrufescens,* Whooping motmot.

Nativo del extremo este de América Central y norte de Sur América. Fue descrito en 1853 con el mismo nombre científico por el Zoólogo británico Philip Lumley Slater.
Su nombre en inglés, es onomatopéyico, siendo su canto un sonido parecido al Whoop. Fue descrito por primera vez en la Zona del canal de Panamá, en ese entonces perteneciente a Colombia.

Estado de conservación:

Fotografía tomada el 4 de Mayo2019. https://ebird.org/species/bucmot3?siteLanguage=es




Saltador papayero: *Saltator coerulescens*, Grayish saltatator

Su nombre define unas condiciones que el ave no tiene, Saltador derivado del latín significa bailarín y Coerulescens color azulado. Es el único saltador colombiano con espalda claramente gris. Una característica distintiva es la linea superciliar blanca que se extiende desde el pico por encima del ojo. En el párpado inferior también tiene un cerco blanco.
Habita en bosques secos también bosques de galería y pastizales enmalezados. Se observa durante todo el año en la ciudad y sus alrededores.
Su alimento es a base de frutos, hojas y semillas. También incluye insectos como hormigas y escarabajos.
Su estado de conservación es de preocupación menor.

Fotografiado el 4 de Mayo 2019.
https://ebird.org/species/grasal3





Bobo punteado: *Hypnelus ruficollis*, Russet-Throated puffbird.

Esta especie se encuentra en el nororiente de Colombia y noroccidente de Venezuela. Habita en matorrales áridos, en medio de árboles dispersos y cultivos abandonados. En ocasiones, se le encuentra en matorrales cerca de cuerpos de agua, como en nuestro caso.
Se alimenta primordialmente de insectos y algunos frutos específicos.
Los especímenes observados casi siempre se ven solo, en ramas bajas desde donde se lanzan al suelo por su presa.
Anidan en termiteros o en nidos abandonados de otras aves. No se conoce con certeza su periodo de incubación.

Fotografia tomada el 4 de Mayo 2019.
https://ebird.org/species/rutpuf1

Azulejo: *Traupis episcopus,*
Blue gray Tanager.

Es un ave sociable y se puede encontrar en áreas pobladas, se le observa en parejas o pequeños grupos.
Se alimenta principalmente de frutas, flores e insectos.
Es común verlos en áreas no forestales, cerca a poblados, plantaciones, parques urbanos.
El estado de conservación es de preocupación menor.
Imagen captada en la orilla occidental del Lago del Cisne (Lago del Caujaral).

Fotografia: 26 de Enero 2020.
https://ebird.org/species/rutpuf1



Mielero común: *Coereba flaveola,* Bananaquit.

Aunque sus colores son parecidos al del Bichofue, su aspecto rechoncho y pequeño, lo hace fácilmente distinguible. En Colombia se encuentra por debajo de los 2000 metros excepto en la amazonía. Su distribución se extiende desde el sur de Méjico hasta Argentina. Permanece solitario o en pareja.

Su estado de conservación es de preocupación menor.

Foto tomada 28 de Marzo 2008.
https://ebird.org/species/banana







Picabuey: Machetornis rixoxa, Cattle Tyrant

Su ambiente es en zonas secas y pastizales con actividades ganaderas. Es la única especie del genero *Machetronix;* su nombre significa ave belicosa. Ha expandido su distribución territorial desde los 800 mts hasta los 2699 mts. según observaciones realizadas entre los años 1995-2000.

La fotografía de la izquierda tomada en el Club. La de abajo tomada en las estimaciones de la Sierra Nevada.
https://ebird.org/species/cattyr?siteLanguage=es







Pitangus sulphuratus (Izquierda), Megarinchus pitangus (derecha)

Luis Pico grueso: Megarynchus pitangua.

Es un ave cuyas características de color la asemejan al Bichofue gritón (*Pitangus sulphuratus),* y al Bichofue menor *(Pitangus lictur),* de quienes se diferencia por el pico que en su base es más ancho y una vocalización también diferente.
Se distribuye desde México hasta el nororiente de Argentina
Es común observarlos en bosques secundarios, en claros de bosques con árboles dispersos y en áreas en montes ribereños. Es menos numeroso que el Bichofué griton.
Se alimenta de insectos, otros invertebrados y vertebrados pequeños que ataca mientras se encuentran posados. Los insectos los atrapa en vuelo. Además ingiere semillas y bayas.
Estado de conservación preocupación menor.
Fotografía: 11 de Agosto 2019.
https://ebird.org/species/bobfly1?siteLanguage=es

Bichofue gritón, Bienteveo: *Pitangus sulphuratus.*

Esta ave es omnipresente en nuestro ambiente, encontrándose en áreas campestre, parques, en el malecón y prácticamente en toda la ciudad.
Es un ave de canto fuerte y característico que lo hace fácilmente reconocible. En sus hábitos citadinos adquiridos por su contactos con los humanos, se le ve atrevida en la consecución de alimentos dejados en el suelo. Es omnívoro; come desde pequeños vertebrados, peces, frutas e insectos.
Al igual que el *Megarynchus pitangua,* presenta una coronilla amarilla oculta en la parte superior de su cabeza.
Es un ave monógama, que se aprecia sola o con su pareja, defendiendo su territorio, su comportamiento es muy adaptable. Es un depredador de nidos ajenos, construye sus nidos con restos de basuras o parte de los nidos de otras aves.
Su población está en aumento.
Fotografía:8 de Septiembre 2019.
https://ebird.org/species/grekis





En la página anterior apreciamos un Sirirí común, Tyrannus melancholicus, (Foto de la derecha) y un Tyrannidae no bien diferenciado. Los miembros de la familia Tyrannidae, son 207 especies, y los anteriores de color amarillo en su región pectoral, desde los bichofue, hasta el tyrannus anterior, son difíciles de identificar, entre los miembros de la misma especie.
Hay otros miembros de la familia Tyrannidae, registrados en el Club Lagos de Caujaral y parques de la ciudad.
El Tyrannus tyrannus o Sirirí migratorio, de la siguiente página a la izquierda y el Tyrannus dominicescis o Sirirí gris, a la derecha en la siguiente página también se observan en los terrenos del Club en diferentes épocas del año.







Eufonia Gorgiamarilla: *Euphonia laniirostris,* Thick-billed Euphonia . ♀

Hembra de Euphonia laniirostris, de colores opacos oliva en la parte dorsal y amarillento en la parte inferior. EL macho es muy vistoso de color azul oscuro lustroso en la parte dorsal y una amplia corona amarilla al igual que la región ventral.
Su estado de conservación es de preocupación menor.

Ave reportada vista en los terrenos del club.

https://ebird.org/species/thbeup1?siteLanguage=es



Golondrina ala blanca: *Tachycineta albiventer*, White-winged Swallow.

Esta ave es residente en clima tropical y subtropical de America del Sur. Estado de conservación preocupación menor.

Foto tomada en el Malecón Puerta de Oro y en el club Lagos del Caujaral.
https://ebird.org/species/whwswa1



https://ebird.org/species/verfly

Cardenalito: *Pyrocephalus rubinus*, Vermilion Flycactcher.

Es la única especie del genero *Pyrocephalus*. Su nombre es un doble referente a su color, es un *Tyrannido* de características diferentes a los descritos de tinte amarillo. Tiene dimorfismo sexual y la hembra es de colores café y blancos.

Los especímenes fueron captados el 4 de Mayo 2019 el inferior y el 16 de Febrero de 2020.







Rastrogero barbiamarillo: *Certhiaxis cinnamomeus,* Yellow-chined Spinetail.

Fuertemente asociada a cuerpos de agua, pequeña ave trepadora y comedora de insectos, mencionada por Aristóteles.
Su alimentación es a base de insectos y se le encuentra en bordes de bosques manglares, pantanos, humedales con mezcla de pastos.
Es un ave muy activa, difícil de fotografiar forrajea sola o en parejas.
Su estado de Conservación es de preocupación menor.

Espécimen fotografiado el 16 de febrero 2020.
https://ebird.org/species/yecspi2

Turpial amarillo: *Icterus nigrogularis*, Yellow Oriole.

Esta ave se distribuye en Norteamerica, Las antillas el caribe colombiano y Venezuela y al norte de Brazil.
Su nombre denomina los colores amarillo del cuerpo y la garganta negra.
El estado de conservación es de preocupación menor.
El espécimen actual fue fotografiado el 16 de febrero de 2020 en los linderos del Club.
También se captó en la misma fecha el siguiente espécimen considerado infrecuente en el área.
https://ebird.org/species/yelori1

Icterus spurius juvenil ♂

Prefiere los bosques abiertos,pastizales con árboles dispersos y huertos.. Es un ave migratoria que pasa el invierno en Centroamérica y el Norte de Suramérica.






Turpial castaño: *Icterus spurius* macho inmaduro.
https://ebird.org/species/orcori?siteLanguage=es

Garzas.

Son aves pertenecientes al orden de las *Pelecaniformes.* De tamaño mediano a grande se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida . Sus cuerpos adaptados a cazar en aguas poco profundas tienen patas largas y cuellos largos que puede ser retraído y lanzado hacia adelante como un arpón para capturar peces y moluscos que son su principal fuente de alimentación.

De hábitos gregarios especialmente en el momento de la postura y cría, siendo sus nidos desordenados y casi planos. En el área del Club, Ciénagas vecinas y algunas Islas del archipiélago de San Bernardo, se han fotografiado 11 especies.

En este documento solo presentaremos los fotografiados en el el área del Club.



Pelicano Pardo: *Pelecanus occidentalis*, Brown Pelican.

Es un ave que encontramos en ambas costas del país, se caracteriza por un vuelo a baja altura planeando en forma grupal sobre su presa. Otra característica importante es su gran pico con una bolsa gular donde mantiene su presa mientras drena el agua de la bolsa. En aguas profundas se zambulle para capturar su presa pero en aguas superficiales lo hace posado en la superficie.
Su presencia en grupos durante la fase de alimentación, es una guía para los pescadores artesanales, para definir los sitios de pesca.


Fotografia: 16 de Febrero 2020.
https://ebird.org/species/brnpel




https://ebird.org/species/greegr

Garza Real: *Ardea alba*, Great White Egret.

Todo su plumaje es blanco, patas largas negras Iris, lorum y pico amarillo.
Su aspecto se hace más llamativo durante el período de apareamiento , aparecen unas plumas escapulares elongadas que pasan por la espalda y terminan más allá de la cola.
En las imágenes de la siguiente pagina se podrá observar también el color verde que adopta el lorum durante este período.
No es la única garza de color blanco, también lo son la garza rojiza durante su fase blanca, la garza patiamarilla y la garcita del ganado.
Durante el sigloXIX el plumaje nupcial era perseguido para ser usado como adorno en los sombreros, por lo que su cacería puso en peligro de extinción a la especie. Hoy su estado de conservación es de preocupación menor.







Garza Azul: *Egretta caerulea,* Little Blue Heron

Es una garza diferente en el sentido de su plumaje que inicialmente no concuerda con el nombre. Tiene un plumaje juvenil blanco; como adulto tiene un color gris azulado con una cabeza de color rufo. En la fase inmadura de cambio de plumaje, el ave tiene un plumaje manchado oscuro con fondo blanco.

El adulto muestra un pico grisáceo con punta negra al igual que en las otras fases. Una característica distintiva son las patas verdosas.

En la siguiente página se aprecian las tres fases de desarrollo del ave: imagen superior y derechas fueron fotografiadas en el área del Club, la primera el 4 de Mayo 2019 y la segunda el 16 de febrero 2020.

La tercera imagen fue tomada en Isla Palma, en el archipiélago de San Bernardo el día 24 de febrero 2020.

https://ebird.org/species/libher?siteLanguage=es







Garza azul: *Egretta caerulea*, Little Blue Heron, adulto, juvenil e inmaduro.

Garceta nívea, o Garza patiamarilla: *Egretta thula,* Snowy Egret.

Sus nombre la definen; es una garza blanca de pico y patas negras pero de pies amarillos, al igual que el *lorum;* es de tamaño mediano. Su plumaje nupcial muestra plumas recurvadas en pecho, coronilla y espalda.
Esta especie fue descrita por Carlos Lineo en 1766 con el nombre de *Ardea garcettea*. Posteriormente fue reclacificada en 1817 por Thomas Ignatius Maria Forster.

Estado de conservación de preocupación menor.

Fotografía realizada 4 de Mayo 2019.

https://ebird.org/species/snoegr







Garza tricolor: *Egretta tricolor,* Tricolored Heron.

Su nombre la define. Es una garza grande, esbelta , con dorso gris pizarra, vientre blanco y el cuello en su parte anterior presenta un rosario blanco.
Los inmaduros tinen un color rufo en el cuello y espalda.
Como casi todas las garzas, vive en ambiente acuático, manglares, pantanos de agua dulce , márgenes de ríos y bordes de lagos.
Se alimenta de peces, lagartos, ranas, pequeños mamíferos, crustáceos , caracoles e insectos acuáticos.
Las poblaciones del norte de América, migran al Sur hasta el norte de Sur América para pasar el invierno.

Fotografía tomada el 26 de febrero 2020
https://ebird.org/species/triher?siteLanguage=es





Garzón azul: *Ardea cocoi,* Cocoi Heron.

Conocida también como garza mora, es la garza más grande de las que habita en Colombia.
Se distribuye en la mayor parte de Suramérica dede Panamá hasta Chile y Argentina.
Habita principalmente en áreas húmedas, como manglares, estuarios, lagos, lagunas y ríos.
A pesar de que alimenta principalmente de peces, ranas e insectos acuáticos, cuando se aleja de los cuerpos de agua se le ha visto alimentarse de ratones y animales muertos.

Fotos tomadas el 16 de Febrero 2020.

https://ebird.org/species/cocher1?siteLanguage=es




Garcita rayada: *Butorides striata*, Striated Heron.


Es un ave robusta que posa con el cuello recogido ocultando su verdadero tamaño, el cual se hace evidente al alertarse. Las imágenes muestran las dos posiciones.
Es de color azul grisáceo con la coronilla negra y los lados de la cabeza, cuello y pecho de color gris. El borde de las plumas de las alas es blanco. Pico negro con mandíbula amarillenta.
Es similar a la Garcita verde (Butroides virences) que aparece en la próxima página.

Fotografías tomadas 4 de Mayo 2019.

https://ebird.org/species/strher?siteLanguage=es







*Butorides striata (izquierda) y Butorides virescens.*Esta última fotografiada en Isla Palma 24 de Febrero 2020.

https://ebird.org/species/rinkin1

Martin pescador grande: Megaceryle torcuata.

Habita cerca de ríos ,lagos, pantanos, estuarios,repertorios de agua, manglares y cultivos de arroz. Se alimenta de peces con una fuerte preferencia por especies específicas. Se le observa perchando pacientemente en ramas que sobresalen de los cuerpos de agua.

Fotografia tomada 16 de Febrero 2020.





https://ebird.org/species/amakin1?siteLanguage=es


Martin pescador pequeño: Chloroceryle amazona.

Percha en ramas sobre el agua y con vuelo rasante en busca de su alimento. Se le percibe solo o en parejas y como características sobresalientes su pico en forma de punta de lanza y su cresta. Presenta color verde aceitoso en cabeza y dorso, collar y vientre blanco con pecho rufo.

Fotografias tomadas 4 de Mayo 2019 y 29 de Febrero 2020







https://ebird.org/colombia/species/neocor/CO

Cormoran: *Phalacrocorax brasilianus,* Neotropic Cormorant.

Los adultos son de color negro. Los inmaduros tienen el pecho marrón oscuro. Piel facial anaranjada, bordeada por una delgada linea blanca. Los individuos de mas de dos años son negros con brillo purpúreo en el pecho y plumas del cuello blanquecinas.
Se sumergen en el agua para capturar sus presas, con el peso del agua en sus plumas puede llegar hasta el fondo de aguas poco profundas. Con frecuencia se le observa perchando expuestos al sol para secar sus plumas.
Habita en lagos de agua dulce, ríos y estuarios salados en ambas costas de Colombia. También se le encuentra en humedales de interior incluyendo ríos, embalses, pantanos y lagunas andinas.
Fotografia tomada 16 de Febrero de 2020.



Gaviotín picudo :https://ebird.org/species/labter1?siteLanguage=es

Picotijera americana: *Rhynchops niger*, Black Skimmer.

Esta ave inverna en Colombia, pero también hay poblaciones permanentes. Como característica morfológica distintiva, su pico, negro en los dos tercios anteriores y color rojo próximal al igual que las patas. La mandíbula inferior del pico es más grande que la superior. Es una especie gregaria y se le observa descansando en bancos de arena junto con gaviotas y gaviotines. Captura sus presas en el agua abriendo el pico y rozando el agua con la mandíbula inferior con la cual detecta táctilmente a sus presas.
Estado de conservación, preocupación menor.
Fotografía: 4 de Mayo 2019.

https://ebird.org/species/blkski






Cigüeñuela: *Himantopus mexicanus*, Black necked Stilt.

Ave patilarga de patas recurbadas, rosadas, con desplazamientos elegante en aguas llanas. El cuello y parte dorsal son negros, Su parte ventral es blanca. El pico negro y puntiagudo es más grande que su cabeza redondeada.
Habita en humedales de aguas poco profundas en la región tropical como pantanos, ciénagas, marismas costeras, lagos , márgenes de ríos, estanques de aguas y campos inundados.
Se alimenta de invertebrados acuáticos, lombrices, mariposas,moluscos, crustaceos y arañas.
Estado de conservación: preocupación menor.

Fotografia: 14 de Julio 2019
https://ebird.org/species/bknsti.







Gallito de ciénaga: *Jacana jacana*.Wattled Jacana. Adultos y juvenil.
https://ebird.org/species/watjac1

Polla azul: *Porphyrio martinica*, Purpule


Común en ciénagas de agua dulce, charcas, lagunas y especialmente en arrozales. Dieta omnívora, encontrándose restos de su misma especie en su estómago, lo que sugiere que también tiene un comportamiento carroñero.
El adulto es inconfundible por sus colores brillantes, mientras que los juveniles tienen un un plumaje beige.
Conservación: preocupación menor.
Fotografía: 16 de Febrero 2020.





https://ebird.org/species/purgal2?siteLanguage=es_UY





Barraquete aliazul: *Anas discors,* *Spatula discors,* Blue-winged Teal.

Ave nativa de América, con dimorfismo sexual, el macho presenta una media luna blanca en la cara, por delante de los ojos que comienza en la región ciliar y termina en la base del cuello. Es la especie de pato migratorio más común en Colombia y en el norte de Suramérica. Es un pato de comportamiento gregario.

Estado de Conservación de preocupación menor.
En la página anterior se aprecian las diferencias morfológicas de una pareja.

Fotografía: 16 de Febrero 2020.

https://ebird.org/species/buwtea?siteLanguage=es



Zambullidor: *Tachybaptus dominicus. https://ebird.org/species/leagre*

Andarrios maculado: *Actitis macularius,* Spotted Sandpiper.

El ave se encuentra en condición de invernaste en Colombia.
Su nombre hace referencia a ave costera manchada.
El aspecto del ave de la fotografía es de plumaje no reproductivo que se caracteriza por pico negro, patas amarillas, cuerpo de color café en la parte dorsal y la región ventral blanca.
Se alimenta especialmente de insectos
El estado de conservación es de preocupación menor.

Fotografia tomada el 26 de Enero 2020.

https://ebird.org/species/sposan?siteLanguage=es_ES





Tigui, playero aliblanco: *Tringa semipalmata,*Willet.

El pico es más largo que el tamaño de la cabeza del ave. Es un ave migratoria desde Estados Unidos donde se reproduce, migra hacia al sur y en Colombia se le aprecia en ambas costas. La apariencia de su plumaje es de estado no reproductivo.
El apelativo semipalmata, hace referencia al aspecto de sus dedos palmeados solamente en la parte proximal.
Estado de conservación de preocupación menor.

Fotografia 16 de Febrero 2020.

https://ebird.org/species/willet1?siteLanguage=es



Zarapito Trinador:*Numenius phaeopus.* Lo identifica el tamaño del ave y la forma del pico.
https://ebird.org/species/whimbr

Aves informadas vistas en el club

En la ***Guia de Identificación de las Aves del Club Lagos de Caujaral*** se informan de 153 especies de aves, algunas de las cuales no son vistas en otras áreas ni parques de Barranquilla. Son aves migratorias o de habitats específicos.

Registro de aves del Club Caujaral.

Se han registrado 72 especies de aves, en ambientes de bosque seco tropical y en habitat lacustre, nativas y migratorias. Esto convierte a este ambiente en una reserva animal para conservar y a la vez para compartir con socios y observadores de aves.
El registro no está completo, por lo tanto la tarea no está terminada y es necesario regresar al sitio de observación en fechas diferentes para completar el paso de aves migratorias.



Grupo de Observadores de aves el día 16 de Febrero 2020.





AVES DEL CLUB LAGOS DE CAUJARAL.

Arcelio U. Blanco Nuñez