

Aves del Embalse del Guájaro.

Arcelio U. Blanco Nuñez



Este nuevo libro, contiene imágenes de las aves encontradas tanto en Campeche como en el Embalse del Guájaro y sus alrededores.
Dada la importancia de la época de la captación de las imágenes, por fines migratorios, prima el valor de la fecha del registro y la imagen captada sobre la calidad artística de la misma.
Los cambios en el clima y lo variado de las temporadas de lluvia, nos obligan a este tipo de información como testigos históricos del cambio climático.

Campeche, Guájaro, las compuertas y canal del dique

El área mencionada en el título se ubica en el centro y sur del departamento del Atlántico, limitando por el sur con el canal del dique que lo separa del departamento de Bolivar.
Es un área con características hidrográficas dominadas por el embalse del Guájaro y lagunas aledañas que se comunican con el Canal del Dique a través de un sistema de compuertas que regulan el nivel de las aguas. Es un área inundable durante las temporadas de lluvia; esto genera un ambiente especial en las riveras, que atrae a diferentes especies de aves que encuentran aquí su alimento.
Es por ello que el registro de fecha y de imágenes, nos servirán como indicativo a futuro de los regímenes de lluvia y la aparición de nuevas especies migratorias o desaparición de las mismas.
Solo al mirar la portada se pueden apreciar la variedad de especies y la cantidad de una de ellas, convirtiéndose en dominante en ese momento de la temporada.
El embalse del Guájaro abarca un área de 160 Km cuadrados con una capacidad de almacenamiento de 400 millones de metros cúbicos de agua con una capacidad de desagüe de 60 metros cúbicos por segundo a través de un sistema de compuertas que la comunican con el Canal del Dique. Es la reserva de peces más importante de la región y fuente de alimento de las aves.
Por otra parte campeche y sus alrededores campestre es un área prioritariamente seca, con formación de charcos y jabueyes artificiales que se llenan durante las temporadas lluviosas lugar a donde arriban las aves estacionales. Iniciamos nuestro recorrido por los alrededores de campeche.



Garcita bueyera: Bubulcus ibis.

EL ave se le nomina garcita bueyera por el hábito de alimentarse tanto de las garrapatas del ganado como de los insectos que van apareciendo al paso de la bestia por los pastisales.
El ave en el árbol se encuentra en fase nupcial, reconocida por la aparición de plumas rojizas mas pronunciadas en la coronilla y en el pecho, también sus patas pueden tomar un tinte rosado.

Fotografía: 29 02 2020





Martin pescador: Chloroceryle amazona macho. Se diferencia de la hembra de la especie por la pechera color rufo.Fotografía: 29 02 2020



Vaco colorado adulto: *Tigrisoma lineatum.* Fotografía: 29 02 2020




Pellar comun: *Vanellus chilensis.* Fotografia: 19 03 2023.



Periquito Bronceado: *Brotogeris jugularis*.

Fotorafia: 29 02 2020





Oropéndula crestada: *Psaracolius decumanus.* Fotografía: 29 02 2020





Turpial amarillo: *Icterus nigrogularis* . Fotografía: 29 02 2020





Siriri comun: *Tyrannus melancholicus*. Fotografía: 29 02 2020



Carrao: *Aramus guarauna*. Fotografía: 29 02 2020



Guacharaca: Ortalis guarrula. Fotografía 19 03 2023.



Gallina de guinea: *Numida meleagris.* Ave domestica insertada en la región.Fotografía 19 03 2023.



Coquito: *Phimosus infuscatus y* Garcita raada: *Butorides striata.* Fotografía 19 03 2023.





Gallito de cienaga: *Jacana jacana.*
Abajo especímenes adultos y juvenil.
Fotografía 19 03 2023.





Alcaraván: Burhinus bistriatus. Fotografía 19 03 2023.



Embalse del Guájaro: Las siguientes fotos son tomadas en el embalse del Guájaro .







Gavilan caracolero hembra: *Rhostrhamus sociabilis*. Fotografía 19 03 2023.



Gavilan caracolero macho. Fotografía 11 12 2022



Barraquete aliazul macho: *Anas discors*. Fotografía 19 03 2023.
Siguiente página hembras forrajeando. Fotografía 11 12 2022







Chavarrí: *Chauna chavarría*. Fotografía 19 03 2023.



Ardea cocoi tragándose un reptil, *Egretta thula, Ardea alba* compartiendo alimentos.
Fotografía 19 03 2023.



Garzón azul: *Ardea Cocoi.* fotogafía: 12 11 2022



Cigüeñuela: *Himantopus mexicanus,* Garza patiamarilla*: Egretta thula,* Garza real: *Ardea alba.*
Fotografía 11 12 2022.



Pellar común: *Vanellus chilensis*. Fotografía 19 03 2023.





Pesca artesanal con atarraya a orillas de un afluente del embalse.
19 03 2023



Polla gris: *Gallinula galeata*. Fotografía 11 12 2022



Vaco colorado juvenil: *Tigrisoma lineatum*. Fotografía 11 12 2022









Todas las fotos fueron tomadas por el autor en diferentes fechas, con el propósito de registro e inventario de aves a través del tiempo. De esto se deduce que habrá que hacer nuevos registros a través del tiempo para completar la tarea inventarial.

Se han registrados en diferentes locaciones y en diferentes tiempos las mismas aves, indicando cuan común son en nuestro ambiente, convirtiéndose algunas en aves locales a diferencias de otras migratorias.

La presencia de las aves la definen los tiempos de la naturaleza, las temporadas de lluvia o de sequía, inundaciones y fertilización de las márgenes de los cuerpos de agua. Allí ellas encontrarán sus alimentos; sustrato indispensable para repletar sus cuerpos y acumular energía suficiente para prepararse para la migración.

Por principio de la naturaleza las aves depositan tantos huevos como sean capaces de alimentar y esto depende de la disponibilidad de alimentos en la época de desovar.

Hemos llegado hasta aquí con un registro de alrededor de 25 especies, con la tarea pendiente de hacer nuevos registros y conteos de especies.

Acaba de comenzar la primavera y se nota en el ambiente el aumento de trino de polluelos y de aves maduras, desde tempranas horas de la mañana, aún antes de la salida del sol.

Barranquilla, 20 de Marzo de 2023





Ardea alba macho con plumaje nupcial

Plumas largas escapulares sobresalen del cuerpo al igual que en el cuello se observa plumas colgantes. Su lorum, cambia de color amarillo a verde.