Agradecimientos

Este libro no hubiera sido posible sin la colaboración tanto editorial como durante “el pajareo” de mi esposa Betty Llanos, a quien he de abonar su paciencia y competitividad en el momento de la identificación de las aves. También se ha unido a la observación, Juan Jacobo, que alterna su ocupación de capitán de barco con la de observación. Así, ya somos tres en la familia y espero llevar el interés por las aves a los otros miembros de la familia. Los agradecimientos no estarían completos si no mencionara al Dr. Hernando Baquero quien nos facilitó unirnos al grupo de observadores del Club Lagos de Caujaral que quedó en primer lugar el Big Day 4 de Mayo de 2019, guiados por Ramón Montes. Sebastian Marchena y Ricardo Delgado.



Aves: Esos dinosaurios voladores.

Arcelio U. Blanco Nuñez.

Aves: Esos dinosaurios voladores



Aves: Esos dinosaurios voladores

Arcelio U. Blanco Nuñez



Acerca de este libro

Observar lo que vemos cuando caminamos, por prescripción o por placer, nos permite apreciar la belleza de la naturaleza y nos acerca al gozo de sensaciones auditivas, visuales y sensoriales. La falta de percepción nos conduce a la “ceguera cognitiva” y a la asensorialidad receptiva.
Este libro tiene el propósito de recuperar esos momentos vividos y compartirlos con los caminantes que se interesan por la observación de la naturaleza. Las fotografías son tomadas por el autor y están tomadas en y en los alrededores de la ciudad de Barranquilla, Colombia.



Aves: Esos dinosaurios voladores.

Arcelio U. Blanco Nuñez.

Aves: Esos dinosaurios voladores



Aves: Esos dinosaurios voladores

Arcelio U. Blanco Nuñez

ESOS DINOSAURIOS VOLADORES.

Las aves son las descendientes emplumadas voladoras de los dinosaurios. Son la estirpe evolucionada después de la extinción ocurrida al final del periodo cretáceo. Se considera que sus ascendientes filogenéticos son los dinosaurios terópodos, cuya característica, que aún persiste, era la de ser bípedos. No todos los científicos están de acuerdo con la afirmación anterior y arguyen que las aves descienden de los arcosaurios, dinosaurios con cadera parecida a la de las aves actuales. No siendo el objetivo del presente libro, el aumentar las desavenencias taxonómicas no ahondaremos en las discusiones planteadas por quienes saben del tema. Este libro está diseñado para compartir la belleza, tal vez no apreciada, de esos seres que con su plumaje, su canto o su exotismo interactúan tímidamente con el caminante de prisa quien no se da el tiempo para apreciar la belleza de la naturaleza.

En las aves canoras, sus trinos se inician antes de la salida del sol, y en la medida que los días se alargan en el estío, también es mayor la duración de su canto. El sol es su reloj y al parecer tiene influencia hormonal, siendo para esta época mayor la producción de testosterona en los machos, la cual tiene influencia en el canto, el color del plumaje y en el deseo sexual del ave. Estas características, canto y plumaje, son señales para la hembra.

Un ave pondrá tantos huevos como polluelos pueda criar. La postura depende de los recursos disponibles, el tiempo de crianza, el tamaño del ave y la energía que tengan que invertir los criadores con su descendencia. Generalmente el huevo es puesto al finalizar la construcción del nido.

Las aves del Barrio Prado.

En Barranquilla, el Barrio Prado fue diseñado cuando la ciudad apenas comenzaba a crecer, y en su diseño se le dio importancia a bulevares parques y jardines. Fue la parte de crecimiento organizado de la ciudad, hoy casi arrasado por la rápida expansión de la urbe moderna. Todavía prevalecen esos parques y bulevares donde se atrinchera una fauna diversa formada por iguanas, ardillas, y una variedad de aves nativas y otras migratorias. Su contacto permanente con los habitantes de la ciudad, quienes se han visto beneficiado por la belleza





del espectáculo natural y la falta de depredadores, han hecho que las aves sean parte del paisaje cotidiano del barrio y cuyos horarios de cantos sirven para marcar amaneceres y horas vespertinas con un ritmo impuesto por el sol.

En esta primera parte del libro mostraré pájaros fotografiados en nuestros ante jardines, bulevares y parques. El libro es un recorrido Lúdico por diferentes ambientes de nuestra ciudad y alrededores.

Las aves serán nominadas con sus nombres vernáculos en orden alfabético y con sus nombres científicos y desde ya

acudo a su benevolencia en los errores de clasificación si los hubiere, por lo divergente que este aspecto suele ser cuando se trata de taxonomías diferentes.

Describiremos algunas características que ayudan a la clasificación e identificación de las aves canoras del barrio. Estas aves son pájaros , es decir voladoras, de pequeño tamaño y pertenecen al grupo de las Paseriformes.

Una característica identificatoria son los dedos de las patas y como se posan en las ramas y perchas. Este grupo son anisodáctilos; tienen cuatro dedos, tres dirigidos hacia adelante y uno hacia atrás para sostenerse al posarse en las ramas.

Los pichones nacen ciegos, sordos y desnudos y esto los hace completamente dependientes de sus padres, lo cual completa el axioma de número de huevos por capacidad de crianza de los padres.





Azulejo: *Thraupis episcopus*

Su presencia en los parques del Barrio no es constante, es posible que solo se le vea como un ave de paso. Es un animal nervioso, inquieto difícil de fotografiar, a diferencia de otros congéneres que están más acostumbrados a la presencia humana.
Mide 16.5 cm, la cabeza, el cuello y la parte inferior son de color gris azulado pálido. Las alas son de un azul más oscuro en las coberteras primarias. La cola es azul. Pico corto cónico y ojos negros intensos.
Se distribuye desde el sur de Mexico hasta el norte de Bolivia y su población es estable.
Es un ave activa y muy sociable, se le encuentra en parejas o pequeños grupos y puede unirse ocasionalmente a bandadas mixtas. Este no es el comportamiento observado en los especímenes del barrio, donde se les observa solitarios e inquietos.
Se alimentan de insectos, arañas y una gran variedad de frutas.

Espécimen captado en el Parque de los Fundadores.
3 de Febrero 2019







Bichofue, Chicha fria: *Pitangus sulphuratus*

Su nombre vernáculo no es más que la imitación de su canto, por eso tiene nombres según creencias y gustos locales; se le conoce como bienteveo, pitohué, cristoviene etc. Este ave paseriforme pertenece a la familia Tyranidae Tiene un hábitat bastante extenso desde el sur de los Estados Unidos hasta las Islas Malvinas, prefiere los espacios abiertos a los bosques, al igual que otros pájaros, su canto es variable, lo intercala con canto para comunicarse, aparearse, marcar territorio.

Mide entre 21 y 26cm de largo al llegar a adulto, el dorso color marrón incluye las alas y la cola. Su cabeza está cruzada por un antifaz negro que cubre los ojos hasta la nuca y sobre él una gran ceja blanca debajo un bonete negro. El antifaz negro se integra hacia adelante, con el pico que termina en un pequeño gancho.

Se alimenta de larvas e insectos que caza volando; complementa su alimentación con algunas frutas como higos y uvas. En ocasiones saquea el nido de otras aves.


El macho y la hembra son similares y comparten la tarea de construir el nido, que hacen con diversos materiales y tiene aspecto desordenado.

Espécimen registrado en el Parque Santander. Se les puede ver durante todo el año.

Canario Silvestre: Serinus canaria

Es originario de varios archipiélagos de la Micronesia, que incluye a las Islas Canarias. Es un símbolo del gobierno de Canarias. Su hábitat natural es en áreas semi abiertas como los huertos y arboledas.
No es un ave nativa de suramericana y ha sido introducido en Panamá, Jamaica y en Colombia. En nuestro barrio, son muy comunes, se les ve comiendo en los pastos de los jardines donde encuentran las semillas de las malas hierbas, e insectos.
El canario silvestre es un pájaro pequeño de 13 cm de longitud, presenta una coloración base verdosa con lineas en las alas de color oliváceo igual que su cola, patas color marrón y pico cónico y corto.
El plumaje del macho es más amarillo y llamativo, su coronilla es anaranjada. Las hembras y los animales jóvenes posen una coronilla menos anaranjada y las tonalidades grisáceas en su dorso son más acentuadas.
Es un ave que pertenece al orden de las Paseriformes, y también es anisodáctilo. No está en peligro de extinción.

Especímenes forrajeando en ante jardines del barrio.
Se les observa durante todo el año.







Cara cara o Pigua: *Milvago chimachima.*

Conocido con múltiples nombres en las regiónes donde habita, como Pigua, Caracara, Cariare sabanero etc. Pertenece a la familia Falconidae, propia de centro y Sur America donde habita hasta el norte de Argentina.
No hay dimorfismo sexual y como es muy común en la familia Falconidae, la hembra es mas grande y pesada. Presenta una linea negra retro ocular sin llegar a ser un antifaz. La cabeza, el vientre y el pecho son de color blanco crema. El dorso y las alas son de color café oscuro. Su cola es larga y redondeada en la punta. Pico y pata de color verdoso.
La Pigua, no es un cazador de vuelo rápido por lo que no es muy eficiente en la caza aérea. Se alimenta de animales pequeños muertos en carreteras, artrópodos, anfibios, ratones, reptiles y frutas. También extrae garrapatas de los plomos del ganado vacuno.
En la depresión momposina los campesinos creen que habrá sequía cuando la pigua canta con insistencia al medio día.


Es un ave ubicua en toda la Región Caribe.





Chirrio : Volatinia jacarina

Esta no es un habitante habitual del barrio. Se le ve en bandadas, por épocas, en las tardes buscando refugio en los árboles donde encuentra semillas con la que se alimenta. Hay dimorfismo sexual siendo la hembra marrón con cabeza más oscura y el macho de color negro con tientes azulados tornasolados; pico corto, cónico, ojo negro. El macho tiene una mancha blanca escondida en el doblez de las alas. Es de vuelo rápido y por su color puede ser confundida con la *Maria mulata, l*a cual tiene el mismo dimorfismo sexual.





Carpintero corona roja: Melanerpes rubricapillus.

Estos pájaros son también conocidos como Carpintero habado (javao); se distribuyen desde el sur de Costa Rica hasta Venezuela Surinam y Guyanas. Los adultos miden aproximadamente 20 cms, su dorso es parecido a los colores de una cebra, las partes inferiores hasta la cabeza incluyendo los ojos son de color gris claro. Las plumas de la cola terminan en punta y son cortas y fuertes, le sirven para sostener el peso cuando están en posición vertical en los árboles.

El macho tiene una coloración roja en la nuca, que define su nombre científico. La coronilla de la hembra es color gris claro.

Se alimenta de insectos, pero también puede degustar en comederos artificiales.

Construye sus nidos en árboles muertos y cactus gigantes donde depositan sus huevos, compartiendo la crianza en pareja.

Para el año 2004, aparecía en la lista roja de especies amenazadas de la UCIN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

Se les observa en cualquier parque, bulevar o antejardín, durante todo el año. Espécimen captado en el Parque Santander el 26 de Marzo 2017. 7:17AM



















Cotorra: *Eupsittula pertinax*

En Barranquilla se les encuentra en parques, jardines y patios con árboles frondosos, en grupos bulliciosos en horas del amanecer y atardecer armando algarabías y devastando frutales y semillas.
Son monógamos y del cuidado de los huevos y las crías se encargan ambos padres; ponen de dos a seis huevos.
Alcanzan la madurez a los tres años.
Tienen un rango de distribución amplio, desde Panama hasta Surinam, pasando por el litoral atlántico de Colombia, Venezuela y el llano colombo venezolano.
Son de hermoso color verde en el dorso y la coronilla es más azulada, el pecho es color oliva opaco al igual que el cuello y la cara. El vientre es verde amarillento la punta de las remeras son de color azul.
Son aves inteligentes fáciles de domesticar, sociables, de rápido vuelo.
Sus mayores amenaza son la deforestación, el comercio ilegal de sus pichones y el uso de herbicidas venenosos.

Especímenes registrados en el Parque Los Fundadores. 20 de Diciembre 2018.

Cucarachero común: *Troglodytes aedon*

Este habitante del barrio fue detectado por primera vez en pareja, saltando entre matorrales y buscando alimento entre las rendijas del anden. Mide de 11 a 13 cm, color café grisáceo por encima con barrado negruzco en alas y cola. La parte anterior del cuello y la parte ventral es de color ante a ante rosáceo que suele ser más pálida en garganta y abdomen.
Vive en regiones semiabiertas y en claros de regiones selváticas, se alimenta de insectos y su estado de conservación es de preocupación menor.

Especímenes captados el 12 de Mayo de 2019.





Cucarachero chupa huevos: *Campylorhinchus griseus*

Es una especie de pájaro suramericano que se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana y Brazil.
Mide 20 cm, su coronilla y nuca son de color café oscuro y toma tonalidades rufas en el dorso; la cola tiende a ser negruzca y las rectrices (plumas de vuelo direccionales de la cola) tienen barras y ápices blancos.
Su estado de conservación es estable y se le considera un ave común.
Se le encuentra en regiones áridas y semi áridas en sitios de matorrales y bosques abiertos, cerca de casas y pueblos.
Se alimenta de insectos y de huevos de insectos. Sus nidos son desordenados y en el barrio se ven sus nidos construidos en árboles muertos defoliados.
En la foto posterior se aprecia una hembra con plumaje erizado y una paja de la palma en su garra, lo cual sugiere su disposición a empollar sus huevos. En las aves de corral como las gallinas esta fase se llama cloquera (gallina clueca o culeca).

Camphylorincus griseus. Ave en estado de conservación estable. Se le ve durante todo el año en El Barrio.
27 de Marzo 2016 6:55 AM





Golondrina pecho gris: Progne chalybea

Golondrina grande tropical de tierras bajas, bastante común en árboles altos u otras estructuras que tengan cavidades para anidar, como los campanarios. El macho presenta, frente, coronilla y partes altas de color azul acero lustroso. Sus alas y colas son negras, la última ligeramente horquilla. Su garganta, pecho y flancos de color café grisáceo y abdomen blanco con estrías oscuras. La hembra es más opaca con manchas en las partes altas y garganta mas pálida que el macho.

Especímenes fotografiados el 3 de Marzo de 2019







Golondrina: *Hirundo rustica*

Es un ave migratoria que se reproducen en Norte America, Norte de Africa, Europa y Asia. Las poblaciones de Norte America invernan en Suramérica Aruba y trinidad.
Mide alrededor de 18 cm y pesa de 16 a 24 g. El macho presenta frente y garganta rufa, coronilla y partes altas azul lustroso y cola negara con parches blancos en las márgenes internas de las retráctiles. Las plumas externas de la cola son notoriamente elongadas. La hembra es mas opaca y presenta cola más corta.
En Colombia se les encuentra hasta 3000 metros de altura.
Su dieta depende del sitio donde se encuentre y de la disponibilidad de insectos especialmente dípteros sobre todo durante el período reproductivo.
Su estado de conservación es de preocupación menor.

Espécimen captado el 7 de Mayo 2019, en el corredor verde de Villa Santos Barranquilla.

Golero o Gallinazo: *Coragyps atratus*

Vive pero no se alimenta en El Barrio. En las tardes se les ve retornar de sus sitios de alimentación en la periferia de la ciudad, hasta los árboles o torres de comunicaciónes donde pernoctan. Es un miembro de la familia de los buitres del Nuevo Mundo *(Cathartidae*) y su presencia se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta el Sur de América.
Es un carroñero, pero también se alimenta de animales recién nacidos, huevos y de las basuras de los humanos; quizá por ello habitan cerca de los emplazamientos de las ciudades.
Son animales sin Siringe por lo tanto no peden cantar, emiten siseos o gruñidos de frecuencia baja.
Es un ave grande con 74 cm de longitud y una envergadura de 1.67 metro. Su plumaje de color negro es lustroso y su aspecto es limpio a pesar de sus costumbres alimenticias. No tiene plumas en la cabeza y el cuello, estando cubiertos por una piel negra rugosa que le facilita hurgar entre las viseras sin manchar el plumaje .


Registrado en los tendidos eléctricos del barrio.28 de Octubre de 2018.



Gallinazo Cabeza roja:

Cathartes aura

Tiene hábitos semejantes al gallinazo cabecinegro. Es un ave carroñera que vuela planeando a mediana o baja altura para detectar sus presas por el olfato, percibiendo animales muertos o carroña. También puede alimentarse de pequeños mamíferos recién nacidos. Es oportunista en su alimentación.
Tiene la cabeza cubierta por una “cera” roja con perforaciones en las narinas, su pico es color blanco. Los adultos posen una cabeza roja con un parche blanco en la nuca, los jóvenes poseen una cabeza color gris-negro opaco.
En estos animales no existe el cortejo. Anidan en repisas rocosas, cuevas, en el suelo y en matorrales. Su nidada consiste de dos o tres huevos blanquecinos con salpicadura marrones los cuales eclosionan entre la quinta y sexta semana. Los pichones tienen un plumón blanco, cabeza descubierta un poco oscura. En Colombia se les encuentra hasta una altitud de 3000 metros.








Cathartes aura en el sitio de pernocta. Gallinazo cabeza roja, pico blanco, con grandes fosas nasales tapizadas por la "cera" roja, el color de las alas en la parte inferior es blanco, antifaz negro. La piel de las patas también es roja. Especímenes captados el 20 de Diciembre 2018 7:11 AM

Loro comun: *Amazona ochrocephala*

Es un ave común como mascota, en nuestro medio, pero muy raramente se le observa libremente, como el ejemplar mostrado en esta página. Al igual que la cotorra, pertenece al orden Psittaciformes y a la familia Psittacidae.
Son animales inteligentes capaces de imitar sonidos y la voz humana.
Miden de 35-37 cm de longitud, plumaje verdoso, coronilla amarilla, pico pálido, ojos naranjas, anillos oculares blanco, pintas rojas hacia la espalda y punta de alas. Son Zigodáctilos, es decir usan dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás para aferrarse a las ramas o a las perchas, cuando se posan.
 Se les halla de a pares más que en bandadas. Se alimentan principalmente de frutas, semillas e insectos.


Espécimen fotografiado en el Parque los Fundadores. 5 de Enero de 2019.



Maríamulata: *Quiscalux mexicanus*

Esta ave de plumaje negro brillante, pupila de color negro intenso rodado de un halo amarillo en el macho, tiene una mirada penetrante, pico largo y robusto. Posee dimorfismo sexual, siendo las hembras de color marrón y de menor tamaño que el macho y con ojos cafés amarillento. Al igual que él macho, su cola es tan larga como su cuerpo.
Practica el macho cortejo a su pareja, con gritos estridentes y baile alrededor de la misma. Es un ave territorial que puede atacar a otros animales y al hombre si penetran en su territorio, acompañado de graznidos estridentes que alertan a los otro miembros cercanos del grupo.
Se distribuye desde Estados Unidos hasta Ecuador recibiendo muchos nombres en los diferentes países.
Con el nombre de María Mulata se le conoce en Colombia y sus costumbres y acercamiento a los humanos con intenciones de robar alimentos han hecho de este pájaro un ave representativa de la Región Caribe donde se le ha reverenciado con varias esculturas en algunas de las ciudades de la costa caribe como Barranquilla, Cartagena, Valledupar y en Cali Valle del Cauca.

Los especímenes de la página siguiente son de varios lugares del barrio donde se les ve durante todo el año. En una de las fotos se aprecia a una hembra con alimentos robados en el pico.









Mirla ollera : *Turdus grayi*

Su nombre en latín *Turdus*, significa mirla y grayi en honor del ornitólogo John Edward Gray.
Se distingue de los otros mirlos parduscos por el pico amarillento y el iris rojizo.
Pesa de 23 a 27 cm de longitud y tiene un peso entre 74 a 76g. Su plumaje es de color marrón y más oscuro en la parte superior que por debajo, ojos rojos y patas rosadas. Los individuos juveniles son manchados.
Su distribución en la costa hasta los 300 metros, se observa desde el Golfo de Urabá hasta el extremo de la Guajira, valle bajo del Cauca y medio del Magdalena en el sur de Bolivar.
Frecuente en cultivos de todo tipo, áreas urbanas y suburbanas, cafetales, jardines, pastizales con árboles dispersos. Se alimenta de lombrices, larvas e insectos adultos y frutos de todo tipo. Forrajea mucho sobre el suelo.
Su estado de conservación es de preocupación menor.



Mielero común,Platanero:
Coereba flaveola

Esta pequeña ave ha sido reportada vista en el Parque Santander y Parque de los Fundadores, sito común de observación para mí, sin embargo no la he visto. Fue necesario ir a Campeche municipio periférico al área Metropolitana para ser observada.
Sus colores son parecidos al del Pitangus sulphuratus con un pico fino ,coronilla negra banda superciliar blanca, banda ocular negra, garganta blanca, dorso gris y pecho amarillo. Mide alrededor de 11 cm y pesa 6.4 a 14.2 gm. No hay dimorfismo sexual.

Espécimen observado el 10 de Febrero 2019



Mosquero: *Elaenia flavogaster*

Es la especie mas común en Colombia y su nombre hace referencia a sus características (elaineos: oliva y Flavogaster: vientre amarillo). Mide entre 15 y 17 cm. Cabeza pequeña y cresta tupida muy llamativa, generalmente partida en el medio exhibiendo un parche blanco. Presenta partes superiores café oliva y rostro ligeramente mas pálido. Las alas son mas oscuras y presentan dos barras alares blancas. Se alimenta principalmente de insectos y frutos con bayas y semillas afiladas. Conservación: preocupación menor.

Espécimen captado el 12 de Mayo de 2019.6:55 AM





Palomas

Las palomas, hoy convertidas en plaga en las ciudades, por el poder corrosivo de sus heces, que ensucian y destruyen monumentos y edificaciones. Tienen connotaciones psicológicas especiales. Son representativas en la iglesia católica del Espíritu Santo, y es el símbolo de La Paz. Aún así, hoy se han convertido en un azote que interfiere con la conservación del patrimonio arquitectónico de la humanidad. Esta conversión de fuente alimenticia nutritiva a tragedia urbana ocurre cuando a inicios del Siglo XX, fueron liberadas de los criaderos de Palomas, al crearse las granjas de pollos.

En nuestra cultura, las mujeres recién paridas acostumbraban a consumir durante el puerperio diariamente un pichón de paloma.
Estos cambios culturales y ante la falta de depredadores naturales eficientes han generado la superpoblación actual de una especie prolífica. Las palomas ponen uno o dos huevos que ambos padres incuban durante 16- 19 días. Las crías pueden volar del día 35 al 37. El ave es un animal inteligente capaz de identificar los peligros y trampas y se dice que es capaz de identificar a personas que las agreden. En algunas ciudades se han introducidos depredadores como halcones pero estos animales tienden a ser solitarios y ante la abundancia de alimento, pierden rápidamente el deseo de cazar.



Columba Livia Pareja monógama, en la cornisa de un edificio, cerca al nido. Ejemplares captado 28 de Diciembre de 2018.



Palomas frente a un Bazar en Estambul, alimentada por transeúntes.

Paloma domestica: *Columba Livia*

Es la paloma familiar que se puede ver por todas partes. Su color es muy variado desde blanco a multicolor. Sus nidos están formados de ramitas, plumas y paja que construye en las cornisas y cavidades de los edificios. Produce cuatro nidadas al año de dos huevos cada una y su distribución es mundial excepto en la Antártida. No son aves migratorias.Su hábitat natural actual son las ciudades donde encuentran más alimentos y mejores circunstancias de anidación. Sus crías son alimentadas con leche de palomas. Esta es una secreción producida en el buche, donde se forma una fina capa de células epiteliales de una decena de células de espesor. Estimuladas por la prolactina, las células acumulan grasa y proteínas que forman una amalgama y es regurgitado convirtiéndose en el alimento de los pichones.


El macho mide de 31 a 34 cm con peso que va desde los 180 a los 355 g. Su iris es de color naranja dorado al rojo naranja, piel orbital gris azul, pico negro con cera blanca y patas rojas.



Palomas en Plaza Cataluña en Barcelona. 28 de Abril 2011




Niño dando de comer a las Palomas. Barcelona. 28 de Abril 2011.



Saltador gris: *Saltator coerulescens*

Esta ave está en una clasificación no bien definida entre las familia Thurpidae y Cardinalidae. Se caracteriza por presentar pico negro con patas gris plomizo banda superciliar blanca y garganta blanca. Las plumas del pecho y ventrales son gris con tinte rojizo hacia la cola. Las coberteras son color gris plomizo al igual que la cabeza.
Se alimenta de semillas y frutos se le observa en grupos y su distribución va desde Méjico hasta Argentina y Uruguay. Mide 20 cm. y pesa 52 g. La tonalidad de sus plumas depende del grado de maduración, siendo de color gris verdoso los más jóvenes.

Aves fotografiadas en el corredor verde del Parque Villa Santos. (Página anterior y en el parque Amira De la Rosa) los días 10 y 24 de Marzo 2019.







Tortolita o tierrelita: Columbina talpacoti

Es una especie nativa de centro y Sur América, que se distribuye desde México hasta el Perú. Es una paloma de cola corta, de vuelo rápido y directo. Mide 17 cm y pesa 47 g. Hay algún dimorfismo sexual, siendo el Macho de cabeza y cuello gris pálido, pecho escamado. Se alimenta de semillas de gramineas y leguminosas nativas. Se desplazan en bandadas y se les ve comiendo en grupos en lugares abiertos.








Los machos presentan cabeza y cuello gris pálido. Con pecho escamado. Las hembras son color rojizo con poca diferenciación de la cabeza y el cuello.

Torcaza naguiblanca: *Zenaida auriculata.*


Esta no es un ave frecuentemente observada en nuestro barrio. Es una especie de ave columbiforme propia de Sudamérica.
Mide 22 a 28 cm de largo, la hembra mide un poco menos.Tiene iris café o rojizo, piel orbital azul o gris, pico gris oscuro a negro y patas rojas. Presenta coronilla y nuca color azul grisáceo, resto de la cabeza, cuello y pecho rosáceo a ante púrpura y sombreado ante, desde el vientre hasta las coberteras infracaudales. Tiene las plumas primarias y secundarias externas negras con estrechos márgenes blancos. Presenta dos estrías faciales negras, una detrás y otra debajo del ojo.
La imagen corresponde a la *Zenaida auriculata rubriceps,* una de las cuatro subespecies que se encuentran en Colombia, ésta en El Valle del Rio Magdalena.




Siriri común o pitirri:
Tyrannus melancholicus

Es un ave muy común en El Barrio, su nombre común es onomatopéyico; y su nombre científico hace referencia a su comportamiento belicoso y territorial.
Mide cerca de 22cm y pesa 40 gm. La cabeza es gris con una mascara negruzca. Su espalda es oliva grisáceo, las alas y cola ligeramente orquilladas de un tono café negruzco, su garganta es gris pálido, las partes inferiores son amarillas. El pico y las patas son negros.
Se distribuye desde Arizona hasta Argentina y la tendencia poblacional es hacia el crecimiento.
Se encuentra en áreas semiabiertas con matorrales, sabanas, jardines plazas y parques. Se posa en perchas expuestas, alambres, ramas secas altas y copas de los árboles. Caza insectos en vuelo. Es notablemente agresivo, persigue y ataca aves grandes como gavilanes y gallinazos que se acercan a su territorio, especialmente cuando está anidando.

Siriri común o pitirri, Observado el 23 de Diciembre de 2018.





Siriri gris: *Tyrannus dominicense*

Es un ave migratoria que aparece en El Barrio para fin de año, viéndoselos en bandadas o solitario posándose en alambres o en las copas de los árboles y ramas altas.
Se distribuye desde el sureste de los Estados Unidos Hasta el norte de Sudamérica, pasando por las Antillas Menores y Mayores.
Se alimenta de insectos voladores, que atrapa en vuelo. Su dieta la complementa con frutas.
Mide alrededor de 23 cm, Tiene cabeza grande y pico negro, máscara estrecha y negruzca , sus alas y cola son de color café negruzco con cola ligeramente ahorquillada y sus partes inferiores blancas con un tinte grisáceo en el pecho.

Espécimen captado el 18 de Diciembre de 2018





Sirirí gris: *Tyrannus dominicense*

Hornero patiamarillo:
Furnarius leucopus

Esta diminuta ave mide 17.a 18 cm, sin dimorfismo sexual. La mandíbula superior es más oscura que la inferior. Presenta banda superciliar blanca que se extiende desde la frente hasta la nuca, auriculares parduscas, área malar rufo leonado.Su garganta es de color blanco. Se le encuentra en áreas húmedas y lodosas, en zonas con vegetación flotante y en matorrales enmarañados. El espécimen fotografiado se le encontró en área despejada de una finca en Campeche Atlántico. Es omnívora y se alimenta especialmente de artrópodos; posible razón de su presencia en esta área. Anida en ramas de los árboles construyendo su nido con barro, pone dos huevos que se incuban por 16-17 días. Ambos padres asisten a las crías en la alimentación. Es una especie que su estado de conservación es de preocupación menor.

Espécimen captado el 10 de Febrero 2019, Campeche Atlántico.



Turpial amarillo: *Icterus nigrogularis*

Esta. Hermosa ave, tiene un nombre descriptivo en latín: Icterus por el color amarillo de la mayor parte de su cuerpo y nigrogularis por el color negro del plumaje en su garganta. Además tiene color negro en la región ocular, alas y cola. Mide alrededor de 20 cm y los machos tienen un peso de 39 gramos promedio. Los individuos juveniles tienen un plumaje menos llamativo y algunas veces sin babero negro. Son insectívoros y complementan su dieta con semillas y néctar. Construyen sus nidos en forma de mochila indígena, de un tamaño aproximado de 50 cm y 11 cm en la parte más ancha, con acceso por la parte superior. En él depositan dos huevos. Se les encuentra en parejas o tríos.

Se le encuentra desde Colombia hasta las Guyanas y el noreste de Brasil. Se les observa en matorrales áridos, montes secos, Zonas pobladas de árboles, arbustos y flores.
Su tendencia poblacional parece ser estable.

Espécimen captado en el Parque Santander el 26 de Agosto 2018 6:19 AM










Nido de Icterus nigrogularis, en forma de mochila de 50 cm de largo 11cm en su parte mas ancha y entrada por la parte superior. Copiarían los Arhuacos el modelo de mochila de este ave?

“La Pajarita”.

Este es el nombre que en Barranquilla se le ha dado a una extraña forma de morir de los árboles. Desde hace algunos años hemos estado observando árboles frondosos que comienzan a perder sus hojas a partir de sus copas y acaban secos y defoliados. Acompañando a este fenómeno, aparece un bejuco parásito, con hojas, que cubre las ramas de la parte superior de los árboles y también muere cuando muere su huésped.

El fenómeno se presenta asociado a la presencia de aves no territoriales, que pernoctan en estos árboles y defecan en sus ramas. En las heces de estas aves hay semillas fértiles que germinan en las ramas del árbol huésped, creciendo el mencionado bejuco, cuyas hojas impiden el paso de luz solar hacia las hojas propias e impidiendo que se sintetice la clorofila.

La clorofila es la fuente energética de las plantas, que sirve en la síntesis de nutriente y en todos los procesos de crecimiento y desarrollo del árbol. Al carecer de ella el árbol empieza a morir. Pero la naturaleza no desecha nada, Estos árboles parecen ser los sitios preferidos para la anidación de algunas aves como carpinteros y chupa huevos.













Mapa de Barranquilla

En Barranquilla y sus alrededores existen en sus parques, y accidentes hidrográficos múltiples sitios de interés para los observadores de aves.
El mapa muestra la desembocadura Del Río Magdalena , la Ciénaga de Mallorquín, y parte de la costa sobre el Mar Caribe.
Los diferentes hábitats que se estructuran en parques, ciénagas, caños, el río y las playas hace de Barranquilla y sus alrededores lugares de interés para la observación de aves.




Magdalena
25
Siape
RIOMAR
Vía 40
MAGDALENA
ATLÁNTICO
Río Magdalena
Zoológico de Barranquilla
Barranquilla
El Palmar
CENTRO
TORICO
Parque Sagrado Corazón
Vía Circunvalar
La Lucha
BR. ABAJO
MAGDALENA
ATLÁNTICO
Río Magdalena
Las Quemadas
Río Magdalena
Carrera 65
Calle 87
Carrera 76
Calle 76
Carrera 59b
Carrera 46
Calle 84
Calle 82
Carrera 42
Calle 84b
Carrera 38
Carrera 36
Calle 72
Calle 67
Calle 54
Carrera 33
Calle 45
Carrera 27
Carrera 25
Carrera 21
Calle 83
Diagonal 78
Calle 70c
Carrera 21B
Calle 60
Calle 53d
Calle 30
Carrera 30
Carrera 23
Calle 14
Carrera 38

Aves de los alrededores de Barranquilla

Barranquilla tiene una posición privilegiada en el borde occidental del delta del Rio Magdalena. En sus alrededores encontramos fuentes hidrográficas como caños, lagunas, el Río y playas marinas. Todos estos forman ambientes para aves que encuentran su alimento en dichas fuentes y son sitio de paso para aves migratorias, además de gallinazos que buscan su alimento en los restos de la basura.
En el área correspondiente al centro histórico, se encuentran cinco caños interconectados en forma de herradura, partiendo Del Río Magdalena: El Caño de la Ahuyama, con un recorrido de 3.6Km y en dirección Este-Oeste y de sur a norte llega hasta la calle seis con carrera 41 donde se conecta con el Caño Arriba. Estos forman el limite occidental de la Zona Franca. Este caño desemboca en forma perpendicular en el Caño del Mercado que transcurre en forma paralela con la calle 30 desembocando en la intendencia fluvial en el Caño de los Tramposos, el cual vuelve al Río Magdalena a través del Caño de Las Compañías.

Sitios de Interés para observaciones de aves en Barranquilla y sus alrededores


Existe una aplicación perteneciente a la Universidad de Cornell, llamada eBird, que estimula la observación, registro, análisis y creación de mapas migratorios de las aves. Es un proyecto de investigación ciudadana que invita a la conservación de las especies de aves. Según este proyectos a continuación listaré los sitios de interés observaciones en Barranquilla y el número de especies reportadas en cada lugar.

Aeropuerto Ernesto Cortizos.	*27 especies.*
Ecoparque Mdetropolitano.	*28 especies*
Jardin Botánico Barrio La Victoria	*36 especies*
Intendencia Fluvial de Barranquilla.	*24 especies.*
Parque Santander y Fundadores.	*27 especies.*
Escuela Normal Superior La Hacienda.	*40 especies.*
Parque Sagrado Corazón.	*27 especies*
Malecón Puerta de Oro.	*29 especies.*
Corredor de Villa santos.	*19 especies.*
Universidad del Norte.	*174 especies.*
Ciénaga de Mallorquín	*104 especies.*
Club Lago de Caujaral.	*112 especies.*
Ciénaga de Mallorquin-Barra Arena.	*86 especies.*
Canchas de Golf Country Club.	*56 especies.*









En la foto se muestran las fuentes hídricas alrededor de Barranquilla. Rio Magdalena, Lago Rincón, Playas de Salgar y Caño de los tramposos.

Alcaraván: *Burhinus bistratus*

Ave de actividad principalmente crepuscular y nocturna. Habita en zonas secas, su nombre Burhinus significa pico de buey y bistriatus, doblemente rayado. Mide 43 a 48 cm, cuello y patas largas, cara color blanca alrededor de los ojos, delimitada por arriba por una línea negra; ojos grandes amarillo con iris negro intenso. Pico corto y robusto. En la parte superior, cabeza y pecho son color café oscuro con estriado dorado. La garganta y su vientre son blancos, los jóvenes son más pálidos con cabeza y cuello teñidos de ante.
En suramerica se les encuentra desde el norte de Colombia hasta el norte de Brasil. Habita en sabanas y pastizales abiertos en regiones áridas y prefiere suelos planos con o sin arbustos. Se reproduce en los períodos secos del año y su estado de conservación es de baja preocupación.

Espécimen captado 4 de Mayo 2019 en Club lagos de Caujaral..




Bobo punteado: *Hypnelus ruficollis*

Es un ave muy peculiar, por su aspecto es fácilmente reconocible. En Colombia se distribuye hasta 1200 mt de altura SNM, en la parte árida de la Costa Caribe desde el río Sinú hacia el oriente hasta la base de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Perijá y al sur hasta El Valle bajo Del Río Cauca y El Valle Medio Del Río Magdalena. Se alimenta de insectos y frutos. Permanece solo o en parejas o grupos laxos hasta de seis individuos.
Se le considera una especie de preocupación menor.

Espécimen observado en el Club Lagos de Caujaral, 4 de Mayo de 2019





Cucarachero blanquinegro:*Camphylorynchus nuchalis*

Se le encuentra en las sabanas del norte de Colombia, y en el centro de Venezuela. Vive en grupos hasta de 10 aves. De éstos, solo dos crían pero todos los miembros participan en la defensa del territorio y en la alimentación de la nidada. Es un ejemplo de crianza en grupo. Los miembros no reproductores están unidos por consanguinidad hasta cuando abandonan el grupo para unirse a un grupos donde serán reproductores. En caso de muerte del macho reproductor, el macho de mayor edad ocupa su puesto.

Especímenes captando 4 de Mayo 2019 Club Lagos de Caujaral.






Cigüeñuela: *Himantopus mexicanus*

Mide de 35 a 40cm y pesa de 166 a 205g. Pico largo negro y patas largas rojas que junto con el plumaje se convierten en colores más brillante en época reproductiva. La coronilla, cuello, alas y cola son de color negro . La parte central del ave es blanca y en su cabeza alterna el color negro periorbital con una ceja y un frontal blanco, lo que le confiere el aspecto de antifaz.
Habita en humedales de aguas poco profundas en la región tropical y templada como pantanos, ciénagas, marismas costeras, lagos, márgenes de ríos, estanques y campos inundados.
Su dieta la consigue en su hábitat y consiste en invertebrados acuáticos, pequeños peces, insectos, moluscos, crustáceos y ocasionalmente semillas.
Anida entre pastos y juncos, también puede hacer nidos flotantes y tiene una puesta de 4 a 6 huevos que son empollados por la pareja durante 22 a 26 días. Las crías pueden volar entre 28 a 32 días después de la eclosión.

Espécimen fotografiado en el Lago del Cisne el 6 de Oct.2018.





Gallito de ciénaga: *Jacana jacana*

Es una de las especies más comunes en los cuerpos de agua dulce. Tiene dedos muy largos que le permiten caminar sobre la vegetación. Las hembras son de mayor tamaño que los machos son poliándricas, formando harenes de cuatro a cinco machos con los que se aparea. La hembra pone huevos para dos o más machos. Los huevos son incubados por el macho que también es el encargado de las crías.
Las patas y dedos, ambos largos, de color verdoso; cabeza , cuello y partes inferiores son negros. Su pico es amarillo con escudo frontal bilobulados de color rojo y carúnculas laterales del mismo color.

Espécimen captado en el Lago del Cisne 6 de Oct.2018



Garceta nivea: *Egretta thula*

Es un ave *pelecaniforme* propia de América. Se distribuye desde Canadá hasta Argentina y Chile. Es. Una garza pequeña de color blanco y pico negro y pies amarillo. Tiene una banda amarilla que rodea los ojos y se extiende hasta la base del pico. Eriza las plumas para exhibirse en el nido.
Viven en marjales o sea zonas cercanas al mar de gran riqueza tanto en fauna como en flora. Y donde encuentra sus alimentos consistentes en camarones, peces, ranas, moluscos, insectos acuáticos, lagartos, culebras y saltamontes.
Mide 47 a 67 cm con peso de 370 gm. Generalmente forman colonias muy grandes con cientos de nidos, que construye con palos cerca del agua a baja altura en árboles o arbustos. Ponen de dos a cuatro huevos que incuban durante 18 días y las crías permanecen en el nido aproximadamente 30 días.

Espécimen del Lago del Cisne 6 de Oct.2018

Garceta tricolor: *Egretta tricolor.*

Es un ave de la especie pelecaniforme, de cuerpo esbelto con una longitud de 50 a 76cm y un peso aproximado a los 300g. Su pico es largo y delgado de color azuloso con la punta negra, durante el periodo reproductivo al igual que sus patas. Durante el período no reproductivo el pico y las patas son de color amarillento.
Su cabeza, cuello, pecho espalda, alas y colas son de azul pizarra. El cuello presenta una franja vertical blanca. El vientre, las coberteras alares internas y rabadilla son completamente blanca. Se encuentra en los ríos y humedales desde el sur de Estados Unidos ,Centroamérica ,hasta Brasil y Perú.

Espécimen observado en el Lago del Cisne 6 de Oct.2018





Garzon azul: *Ardea cocoi*

Es la garza más grande y esbelta de Colombia; mide de 102 a 130cm de longitud. Presenta el cuello, la parte alta del pecho y los muslos blancos. La coronilla es negra con dos plumas largas que cuelgan sobre el cuello. Abdomen negro y espalda y cola de color gris azulado.
Se extiende desde el oriente de Panamá, hasta Chile y Argentina. Habita principalmente en áreas húmedas como manglares, estuarios, lagos, ciénagas, lagunas y ríos.
Es un ave tímida y arisca; pesca desde la posición que toma utilizando su cuello como lanzadera.
Su estado de conservación se registra como preocupación menor.

Espécimen captado el 4 de Mayo de 2019.
Club Lagos de Caujaral.



Garza real: *Ardea Alba*

Ave pelecaniforme de la familia *Ardeidae,* elegante de largas patas negras, esbelta, toda blanca ella. Iris, forum y pico amarillo. Alcanza una altura de hasta un metro. Los juveniles son iguales a los adultos.
En época de celo, presentan un manojo de plumas finas, largas que parecen desaliñadas, en el dorso. No son planas y le dan una extraña belleza. Estas plumas desaparecen en la medida que pasa el período de apareamiento y lo presentan tanto los machos como las hembras. Estas aves vuelan con el cuello encogido, mismo que utilizan como lanzadera para capturar sus presas.
Tiene una distribución global, encontrándosele en todos los continentes excepto en la Antártida. Reside en manglares, estuarios, pantanos de agua dulce, lagunas y ríos. Se posan sobre árboles elevados con otros pájaros coloniales del agua.
Su dieta se compone de peces, lombrices, insectos, anfibios, reptiles aves y mamíferos pequeños.
Sus nidos generalmente los coloca en las copas de árboles altos o en las ramas bajas de aquellos árboles que dan sombra sobre los ríos, lagunas o manglares. Anidan en colonias. La postura es de tres a cinco huevos. Los polluelos abandonan el nido cuando están en disposición de volar y mientras se alimentan merodean por los alrededores de su morada.

Página siguiente: Especímenes fotografiados en el Lago del Cisne 6 de Oct.2018









Garrapatero comun: *Crotophaga ani.*

Esta es un ave de la familia *Cuculidae* de color negro y plumaje escamado, su nombre deriva del griego y significa que come garrapatas. Mide 35 cm el macho y peso 115gm. Las hembras son de menor tamaño sin existir un dimorfismo sexual.
Su característica principal es el pico, el cual es achatado hacia los lados y curvado hacia abajo, de color negro; los ojos son obscuros y están rodeados de piel negra. Las patas son zigodactilas, es decir , con dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás al posarse en los árboles o perchas.
Se distribuye desde el sur de la Florida hasta Uruguay y Argentina. Se le encuentra en gran cantidad de ecosistemas abiertos como zonas xerófilas, matorrales, orillas de selvas y bosques y en zonas urbanas.
La imagen de la pagina siguiente, fue captada en el área Peri urbana de Barranquilla, en Punta Roca. Se le encuentra frecuentemente en Fincas de los alrededores del área metropolitana.

Espécimen fotografiado en Punta Roca 4, de Junio 2016.



Gaviotin picudo *Phaetusa simplex.*

Mide alrededor de 38cm; pico amarillo, cola ligeramente escotada. El plumaje reproductivo presenta coronilla negra, manto y cola gris. Sus alas presentan un patrón de coloración con primarias negras y secundarias blancas. Las partes inferiores son. Blancas con los lados de los flancos con flecos grises.
Su dieta es a base de insectos y peces. Habita en ríos y lagos. Durante el período reproductivo se le encuentra en playas de ríos y bancos de arena. Permanece solitario o en parejas, pero se reúne en grandes grupas para pasar la noche. Su estado de conservación es de preocupación menor.

Especímenes captado el 19 de Marzo de 2018







Espécimen captado en Punta Roca 04 08 2019.

Pellar teru-teru:
Vanelus chilensis.

Esta es un ave que he apreciado en Puerto Colombia en el área de Punta Roca y en el Club Lagos de Caujaral.
Es conocido con múltiples nombres vernáculos com Peque, Avefría, Pillar. Esta ave se distribuye principalmente en el continente Suramericano, donde se le encuentra en Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina Uruguay y Perú. En Uruguay se le considera el símbolo de la selección nacional de rugby. Habita más comúnmente en las cercanías de cañadas y lagunas.
Es un ave elegante, estilizada y su cabeza está coronada con un fino copete, ave Zancuda de 30 a 35 cm de largo con un pico rojo en la zona próxima que termina en una punta negra, los ojos y las patas son rojas. Presenta una mascara frontal negra que desciende en forma lineal por el cuello hasta la región pectoral anterior donde se convierte en una pechera negra que contrasta con el color blanco de su vientre y los colores marrones en diferentes tonalidades y algunos iridiscente en sus alas, también presenta unas plumas negras en la parte inferior de las alas.
Los jóvenes se diferencian de los adultos por la ausencia de rojo alrededor del ojo y menor tonalidad de tonalidades en las plumas.
Se alimentan de insectos y pequeños vertebrados como lagartijas. Para cazar hacen una pequeña carrera de dos o tres pasos, se detienen y lanzan un picotazo hacia adelante.
Su estado de conservación es de preocupación menor.

Picotijera americano:*Rhynchops niger*

Tienen pico grande en forma de hoja de cuchillo con la mandíbula inferior más larga que la superior y de color rojo brillante con ápice negro. Patas palmeadas de color rojo naranja al igual que la parte próxima del pico.
Su cuerpo es de color negro por encima, con la frente, el borde posterior del ala y partes inferiores de color blanco. Los jóvenes son más cafés.

Especímenes del Lago del Cisne en el Club Lagos de Caujaral. 4 de Mayo 2019






Trepador Pico de lanza:
Dendroplex picux

Ave sin dimorfismos sexual, siendo el macho mayor que la hembra. Mide de 18 a 22 cm y pesa entre 32 a 34 g. Su iris es café rojizo o café oscuro, pico color cuerno grisáceo, patas verde oliva opaco. La característica mas conspicua es el aspecto escamado de su cabeza, garganta y parte superior del pecho.

Se le encuentra en una variedad de hábitat de tierras bajas como manglares, matorrales áridos, bosques de galería, bosques secos y salvas húmedas y tierra firme. Se alimenta de artrópodos pequeños.

Espécimen, captado en Club Lagos de Caujaral 4 de Mayo 2019



Otras aves del litoral Atlántico

La Costa Caribe de Colombia y las Islas del archipiélago de San Bernardo en el Golfo de Morrosquillo y las Islas del Rosario son un nicho de riqueza aviar, con aves propias del litoral, algunas migratorias y otras introducidas por colonos en los hábitat naturales y en los centro de turismo.

Las Islas y el litoral de la Costa Caribe son ricas en manglares, vegetación importante en la producción de biomasa y procesamiento de agua salada, la cual desaliniza.

En el proceso de desalinización, la planta secreta la sal absorbida a través de sus raíces en las aguas pantanosas, por el envés de sus hojas donde tiene unas glándulas especiales, mientras que conserva el agua por una cutícula cerea protectora del dorso de las hojas, evitando así la deshidratación de las plantas.

Se genera un micro ambiente con un olor peculiar que caracteriza a estos pantanos. Son vitales los manglares para el planeta pues sirven de refugio a peces que ven a desovar en sus raíces, mantiene la integridad litoral al proteger la costa del embate de las mareas altas, sirven de perchas nocturnas a las aves que normalmente habitan en el área o de aves migratorias, donde forman grandes colonias. Un ejemplo de ello es la Isla Pajarales del archipiélago de San Bernardo.



Carriquí: *Cyanocorax affinis*

A pesar de no ser un ave nativa de las islas se le encuentra con frecuencia, haciéndose notar por su comportamiento escandaloso. Esta ave ha sido introducida por los pobladores de las islas. Su nombre significa cuervo azul.
Se encuentra en Colombia viviendo hasta los 2600 mts de altura en forma gregaria. Mide de 33 a 36cm y pesa entre 194 y 232 g. El macho tiene la cabeza principalmente negra Con manchas azules encima y debajo del ojo., Lo más llamativo es el contraste entre el color negro azulado de su cabeza , dorso y pecho contrastando con la parte central blanca y la cola con las plumas rectrices blancas. Es fácil de identificar en sus ambiente por su plumas rectrices blancas en sus ápices.

Isla Barú, 2 de Agosto 2016.

Cormoran neotropical: *Phalacrocorax brasilianus*

Son aves acuáticas que capturan su alimento zambulliendose en el agua. Se alimentan de peces que capturan bajo el agua. Pueden zambullirse por más de un minuto y llegar hasta diez metros de profundidad. Su capacidad de buceo esta relacionada, con un plumaje no impermeabilizado que al entrar en el agua gana peso y la lleva hasta el fondo. Al salir secan sus plumas exponiendo sus alas al sol.

Mide de 58 a 73 cm y pesa alrededor de 1800g. No hay dimorfismo sexual. El adulto es negro brillante con pico negro, largo y delgado, con un gancho en el extremo. Sus patas son negras y presenta bolsa gular y piel facial desnuda de color amarillo opaco delineado en su parte posterior por una estrecha banda blanca. Los adultos de mas de dos años tienen un brillo purpúreo en el pecho y las plumas del pecho blanquecinas.

Isla Palma 4 de Abril 2015





Phalacrocorax brasilianus: Captado en Club lagos de Caujaral. Mayo 4 2019

Garcita Rayada: *Butorides striata*

Ave robusta de 35 a 48 cm de longitudes un peso que oxida entre 135 y 250 g.Su cuerpo es azul grisáceo con la coronilla negra, y los lados de la cabeza, cuello y pecho de color gris. Raya blanca que va desde la garganta hasta el pecho, la espalda es gris verdosa y la colas y alas verde oscuro.Pico negro con mandíbula amarillenta, patas amarillas opacas y banda amarilla delante de cada ojo. Acostumbra a recoger el cuello sobre el cuerpo dando la impresión de que su cabeza estuviera incrustada en sus hombros.
Se alimenta principalmente de peces, anfibios, insectos, arañas, lombrices, cangrejos, reptiles y hasta ratones.
Su estado de conservación es de preocupación menor.

Espécimen captado en el Club Lagos de Caujaral. 4 de Mayo de 2019.



Flamenco: *Phoenicopterus ruber.*

Es un ave peculiar, de patas y cuello largo de color rosado siendo la única representante de esta familia en Colombia.
Mide entre 120 y 160cm, con una envergadura que alcanza entre 140 y 165cm, con un peso apenas de 2.2 a 3.4Kg. Tiene un inconfundible color rosado; pico peculiar doblado hacia abajo con una lengua grande espesa y carnosa. Ojos pequeños y cuello largo con una gran flexibilidad debido al tamaño y ubicación de sus vértebras. Sus largas patas terminan en pies palmeados con dedos cortos. En Colombia su distribución Se concentra en humedales costeros.
En la página anterior se aprecian varios especímenes alimentándose en un jardín recién sembrado de manglares. Se alimentan de noche y día, succionando con su pico el fango que previamente han removido con sus patas haciendo movimientos de pasos de soldado. El color de sus plumas se debe a los carotenoides que ingiere.

Flamencos en Isla Palma. 3 de Abril de 2015.

Fragata: *Fregata magnificens*

Elegante ave marina de océanos tropicales, color negro de cola bifurcada de aspecto de tijera que le da el nombre vernáculo de tijereta marina. El macho tiene una bolsa gular roja que la utiliza para galantear durante el cortejo de apareamiento y es de belleza contrastante con su color negro. La hembra adulta tiene el pecho blanco y una barra color oro en el hombro.
El macho mide 1 m de longitud, y 2.2 mts de envergadura y pesa 1.2Kg el macho y 1.7 la hembra. Es un ave cuyas plumas carecen de impermeabilización, no siendo pescadoras; por lo tanto atacan a otras aves obligándolas a regurgitar su presa, la cual captura en vuelo, demostrando su gran maniobrabilidad en el aire. Anida en colonias donde se convierte en un ave bulliciosa, siendo muy silenciosa en vuelo.



Fragata: Fregata magnificens. Cartagena 3 de Octubre 2018.



Guacamaya azul y amarilla: Ara araurana.

Esta es un ave común muy vistosa y apetecida por los traficantes de aves por su valor ornamental e inteligencia que puede llegar a repetir los sonidos humanos y a veces con sentido. Fue llevada por Colón como mascota a España en su primer viaje. Mide aproximadamente 84cm y pesa entre 995 y 1380 g. Su frente y coronilla son verde que se degrada progresivamente tornándose de color azul, que cubre toda la parte dorsal del animal. El área facial desnuda, de color blanco con lineas oscuras. Posee pico negro y una cola muy larga. La parte ventral del ave es amarilla. Vuela en pareja y cubre grandes distancias desde los sitios de alimentación hasta su refugio nocturno. Su estado de conservación no está en peligro. Se alimenta de frutos de diferente género y se le ha visto ingiriendo arcilla con lo cual neutraliza las toxinas de las plantas que ingiere.

Especímenes fotografiados en Isla Palma, 4 de Abril 2015





Guacamayo rojo o guacamayo bandera: Ara macao.

Estas vistosas aves, al igual que la anterior, pertenecen a la familia de los psitacidos, de donde viene la palabra Psitacosis enfermedad adquirida por el contacto con estos animales. Es un ave social que puede llegar a formar bandadas de varias docenas de miembros, los cuales se reúnen para buscar alimento, acicalarse, protegerse mutuamente y dormir juntos. Se comunican a travez de la vocalización a través de chillidos fuertes y agudos. Son endogámicos y su estado de conservación según la UICN (Union Internacional para la Conservación de la naturaleza) es de preocupación menor.
Su relación con el ser humano es añeja desde las primeras civilizaciones precolombinas. Los Mayas y los Aztecas la vinculaban con la religión, al relacionarla con las deidades del fuego y del sol. Sus plumas son apreciadas en el arte plumario.
Mide entre 84 y 89 cm y pesa de 900 a 1490 g. La mayor parte de su cuerpo es roja, posee una cola mu larga y aguda, Sus coberturas alares superiores son amarillas y sus rémiges, rabadilla y rectrices externas son azules
Habita en bosques húmedos de tierra firme, bosques de galería y con frecuencia se le observa en bosque cera de los márgenes de los rio.

Fotografía captada el 4 de abril de 2015 en Isla Palma.







Pelicano: *Pelecanus occidentalis*

Es un ave grande, mide 105 a 152cm , ambos sexos similares con peso aproximado de 3.5Kg.Los adultos y los jóvenes se diferencian en su plumaje. Los jóvenes son de color café sucio por encima, pico gris y por debajo son de color marrón sucio. Durante el período reproductivo , la cabeza es de color blanco y presenta una lista del mismo color en los lados del cuello. En Colombia se encuentran dos de las seis subespecies. El *P.o carolinensis* en la Costa Caribe y la raza *murphyi* en la Costa pacífica. Es un ave marina, prefiere las aguas costeras poco profundas, se alimenta de peces y al parecer presenta cierta preferencia por las



...

anchoas, sardinas y arenques. También se alimenta de camarones y de los restos que arrojan los barcos pesqueros.Una de las características principales es su largo pico y su gran saco gular, que utiliza para la captura de sus presas y el drenaje del agua recogida durante la captura.
La relación del pelícano con el hombre ha sido conflictiva, puesto que se le ve como una competencia para la pesca. Pero dónde hay bandadas de Pelícanos hay peces, así que se le debería considerar como un indicador de sitios para pescar.

Pelicano en período reproductivo, 9 de Diciembre de 2017



Torcaza cabeciblanca: *Patagioenas leucocephala*

Mide 29 a 40cm y llega a pesar de 200 a 309 g. La característica mas prominente es el color blanco de la cabeza que es el origen de su nombre (leucocéfala), en su nuca presenta una coloración verdosa con márgenes negras que le da la apariencia de un escamado. El pico es de color rojo como sus patas, pero puede ser morado con su punta blanca. La hembra es similar al macho pero con la coloración un poco más opaca.
Se le encuentra en todo el caribe desde los cayos de la Florida, Puerto Rico, República Dominicana, México y noreste de Panamá. En Colombia se ha registrado en Isla Tortuguilla en la plataforma continental del Caribe. Este especimen se ha registrado en Isla Palma del archipiélago de San Bernardo.
Su hábitat de alimentación es diferente al hábitat de reproducción. Anidan en los mangles, especie muy común en estas Islas y se alimentan de frutas.


Espécimen registrado en Isla Palma 4 de abril 2015



Vuelve piedras: *Arenaria interpres*

Invernante en Colombia, encontrándosele en ambas costas. Mide 21 a 26 cm pesa entre 84 y 90 gm. Envergadura der 50- a 57 cm, sin dimorfismo sexual. Patas cortas de color naranja y pico negro, delgado agudo y ligeramente recurvado en el extremo.Sus partes superiores son de color castaño rufo con parches de color negro parduzco. Las partes inferiores son blancas.
Su dieta es variada consumiendo material vegetal e invertebrados, la cual se hace mas amplia en temporada invernal incluyendo insectos, crustáceos, moluscos, equinodermos, huevos de aves y peces.
Es un ave de preocupación menor con tendencias poblacionales a la disminución.

Espécimen captado en Isla Palma, 3 de Abril de 2015



Colibríes o chupa flor.

Esta aventura no ha terminado, el todo estaría incompleto si no incluyera en esta exposición local y regional de aves, a un grupo de avecillas diminutas y laboriosas, que con su incansable abatir de alas se suspenden en el aire para libar de las flores su néctar. Alimento que también pueden adquirir de comederos artificiales como los observados en la siguiente serie de fotografías. Complementan su dieta con insectos. Una de las características de estas aves, es su pico, largo tubular con lengua extensible. Hay dimorfismo sexual, siendo el plumaje de los machos más brillantes e iridiscentes que el de las hembras.
Son exclusivos del Nuevo Mundo, habiendo en Colombia 162 especies, su estado de conservación no se conoce.
Los especímenes mostrados se observaron en libertad en las estivaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en la población de Minca.

Algunos datos curiosos sobre los Colibríes.

1. Es el ave más pequeña del mundo.
2.Es la única ave que puede volar hacia atrás.
3. Es capaz de volar hacia abajo .
4. Es incapaz de caminar.
5. Su corazón alcanza un máximo de 1200 latidos por minuto.
6. Es el animal vertebrado más pequeño.
7. Pueden mantenerse suspendidos en al aire inmóviles.
8. Pueden abatir sus alas hasta 80 veces por segundo.
9. Puede realizar hasta 500 respiraciones por minuto.
10. Puede realizar cambios de dirección muy repentinos con precisión comparable a la de un helicóptero.
11. Si un hombre consumiera la misma cantidad de proteínas que un colibrí en relación a su peso, tendría que comer 130 kilogramos diarios.
12. El pico espada tiene un pico que es tan largo como su propio cuerpo.
13. Su vuelo es similar al de las mariposas, es considerado perfecto.




texto



Epílogo.

Se ha llegado hasta aquí con un entusiasmo renovado por la gran aventura vivida al aprender algo sobre las especies de pájaros que encontramos a nuestro alrededor. Pero Colombia es un país de gran variedad y cantidad ornitológica por lo que he realizado hasta aquí es un pequeño muestrario de la diversidad de nuestra riqueza y diversidad de hábitats. Lo que aquí ha comenzado me ha dado la oportunidad de conocer a otras personas interesadas en el "pajareo" y conservación de nuestros hábitats y me propongo comenzar a compartir con ellos algún proyecto que reúna las aves de un entorno mas amplio.

Durante esta aventura se han consultado las siguientes fuentes bibliográficas:

Wikiaves de Colombia. Universidad Icesi Cali.

Patrimonio emplumado de la Universidad del Norte.

Aves en Colombia: Murray Cooper.

El Pais de las aves: Colombia. Lucía Jaramillo de Olarte.

El extraordinario mundo de las ave. Los secretos de la observación. Luis Martínez.

El ingenio de los pájaros. Jennifer Ackerman

Las fotos, todas tomadas por el autor, me han llevado a la adquisición de la cámara Nikon Coolpix P1000 con aumento óptico de 3000 con función específica para fotografiar aves. Para la señalización del ave, el ayudante utiliza un láser verde y utiliza binóculos marca Cannon 10X50.